

UNICAST®

Montelukast Sodium

Description:

UNICAST® (Montelukast Sodium) is a selective and orally active leukotriene receptor antagonist that binds with high affinity and selectivity to inhibit the cysylenti leukotriene CysLT1 receptor. It blocks leukotrienes, the naturally occurring chemicals in the lungs, which cause narrowing of the airways and inflammation in the lungs which can lead to asthma symptoms. Leukotrienes also contribute to the symptoms of allergy; therefore blocking leukotrienes improves seasonal allergy symptoms.

Properties:

Montelukast is rapidly absorbed following oral administration with more than 99% bound to plasma proteins. Montelukast has minimal distribution across the blood-brain barrier, while the steady state volume of distribution of Montelukast averages 9 to 11 liters.

Montelukast is extensively metabolized but with undetectable plasma concentrations of metabolites at steady state in adults and pediatric patients. The plasma clearance of Montelukast averages 45 ml/min in healthy adults. Montelukast and its metabolites are excreted almost exclusively via the bile. The plasma half-life of Montelukast is slightly longer in the elderly. No dosage adjustment is required in the elderly patients, in patients with mild to moderate hepatic insufficiency and in renal insufficiency patients.

Indications:

UNICAST® is prescribed for the treatment of:

- **Asthma:** **UNICAST®** is used for the long-term treatment of asthmatic patients, adults and children ages 12 months and older who are not adequately controlled on their asthma medications and need additional therapy. Montelukast should not be used for the immediate relief of an asthma attack.
- **Prevention of exercise-induced asthma:** **UNICAST®** is used for the prevention of exercise-induced asthma in patients 15 years of age and older.
- **Allergic Rhinitis:** **UNICAST®** is used to help control the symptoms of allergic rhinitis (sneezing, stuffy nose, runny nose, itching of the nose).

UNICAST® is used to treat seasonal allergic rhinitis in adults and children ages 2 years and older, and treatment perennial allergic rhinitis in adults and children ages 6 months and older.

Dosage and administration:

- **Children, 2 to 5 years:** The usual dose is one **UNICAST®** 4 mg chewable tablet daily.
- **Children, 6 to 14 years:** The usual dose is one **UNICAST®** 5 mg chewable tablet daily.
- **Adults and adolescents 15 years of age and older:** The usual dose is one **UNICAST®** 10 mg tablet daily.

Patient notes:

- **UNICAST®** is administered in the evening, at bedtime, without regard to food intake and should be chewed (**UNICAST®** 4 & 5 mg chewable tablets) or taken (**UNICAST®** 10 mg tablets) at about the same time each day.
- **UNICAST®** should not be used together with other products that contain the same active ingredient.
- It is important to continue taking **UNICAST®** in the presence or absence of symptoms, for as long as the doctor prescribes it, in order to help maintain control of the patient's asthma. **UNICAST®** can treat asthma only with continued use.
- For exercise-induced asthma, the patient should take **UNICAST®** at least 2 hours before exercise, but not more than once daily.
- **Measures used that helps reducing the severity of asthma symptoms and the frequency of asthma attacks:**
 - o Avoid or reduce contact with conditions that may trigger an asthma episode (e.g. smoking including passive smoking, house dust mites, cockroaches, moulds, pollen, animal dander, changes in weather and temperature and infections in the upper airway such as colds).
 - o Develop a treatment plan that best controls asthma, which includes proper use of all prescribed medication for asthma.

Contraindications:

Hypersensitivity to Montelukast or any of the excipients available in the product.

Precautions:

- **UNICAST®** 4 mg chewable tablets are for children aged 2 to 5 years but not recommended for use in children less than two years of age since the safety and effectiveness of Montelukast in children younger than 2 years old have not been established yet.
- **UNICAST®** 5 mg chewable tablets are for children aged 6 to 14 years while **UNICAST®** 10 mg tablets are not recommended for use in children under 15 years of age.
- **UNICAST®** 4 mg & 5 mg chewable tablets contain Aspartame, a source of phenylalanine. The phenylalanine in the tablets may be harmful to patients with phenylketonuria.
- **UNICAST®** 10 mg tablets contain Lactose. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take Montelukast.
- **UNICAST®** is not intended for the treatment of sudden attack of breathlessness and should never be used for this purpose. If an attack occurs, the instructions that the doctor has given should be followed exactly. It is very important to have the medication needed for such an attack (i.e. a short acting inhaled beta-agonist) readily accessible at all times.
- It is important that the patient uses all the asthma medication prescribed by the doctor as intended. Montelukast should not replace steroid medications (whether inhaled or taken by mouth) that the patient may already be using.
- Patients with Aspirin-sensitive asthma and who taking Montelukast, must continue the treatment and to avoid taking Aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory drugs.

UNICAST®

Montelukast Sodique

Description:

UNICAST® (Montelukast Sodique) est un antagoniste de récepteur de leukotriene sélectif et oralement actif qui lie avec l'haute affinité et l'haute sélection gêner le récepteur de CysLT1 de leukotriene de cysylenti. Il bloque leukotrienes, les produits chimiques naturellement arrivant dans les poumons, qui causent rétrécissent des artères et d'inflammation dans les poumons qui peuvent mener aux symptômes d'asthme. Leukotrienes contribue aussi aux symptômes d'allergie; bloquant donc leukotrienes améliore les symptômes d'allergie saisonniers.

Propriétés:

Montelukast est absorbé suvamment rapidement l'administration orale avec plus de 99% limite aux protéines de plasma. Montelukast a la distribution minimale à travers la barrière de sang-cerveau, pendant que le volume de l'état constant de distribution de moyennes de Montelukast 8 à 11 litres. Montelukast considérablement est transformé par métabolisme mais avec les concentrations de plasma invisibles de métabolites à l'état constant dans les adultes et de maladies pédiatriques.

Le dégageement de plasma de moyennes de Montelukast 45 ml/minimum dans les adultes sains. Montelukast et son métabolites est prescrit exécuté exclusivement via la bile.

La demi-vie de plasma de Montelukast est légèrement plus longue dans les personnes âgées. Aucun ajustement de dosage est exigé dans les malades âgés, dans les malades avec doux pour modérer l'insuffisance hépatique et dans les malades d'insuffisance rénau.

Indications:

UNICAST® est prescrit pour le traitement de:

- **Asthme:** **UNICAST®** est utilisé pour le traitement à long terme de malades asthmatiques, les adultes et les enfants vieillissent 12 mois et plus vieux qui ne sont pas suffisamment contrôlé sur leurs médicaments d'asthme et a besoin de la thérapie supplémentaire. Montelukast ne devrait pas être utilisé pour le soulagement immédiat d'un assaut d'asthme.
- **Prévention d'asthme d'exercice-induit:** **UNICAST®** est utilisé pour l'empêchement d'asthme d'exercice-induit dans les malades 15 ans majeurs et plus vieux.
- **Rhinitis Allergique:** **UNICAST®** est utilisé pour aider le contrôle les symptômes de rhinitis allergique (éternuement, le nez ennuyeur, le nez liquide, démanchement du nez).
- **UNICAST®** est utilisé pour traiter rhinitis allergique saisonnier dans les adultes et les enfants vieillit 2 ans et plus vieux, et le traitement rhinitis allergique perpétuel dans les adultes et les enfants vieillit 6 mois et plus vieux.

Dosage et Administration:

- **Les Enfants, 2 à 5 Ans:** La dose normale est un **UNICAST®** 4 mg la comprimé mastiquable quotidienne.
- **Les Enfants, 6 à 14 Ans:** La dose normale est un **UNICAST®** 5 mg la comprimé mastiquable quotidienne.
- **Les Adultes et les Adolescents 15 ans majeurs et plus vieux:** La dose normale est un **UNICAST®** 10 comprimé de mg quotidienne.

Notes de Patient:

- **UNICAST®** est administré dans le soir, à l'heure du coucher, sans la prise de nourriture d'égard et devrait être maché (**UNICAST®** 4 & 5 mg les comprimés mastiquables) ou pris (**UNICAST®** 10 comprimés de mg) à du même temps chaque jour.
- **UNICAST®** ne devrait pas être ensemble utilisé avec les autres produits qui contiennent le même principe actif.
- C'est important de continuer à prendre **UNICAST®** dans la présence ou l'absence de symptômes, pour pouvu que le médecin le prescrit, pour aider maintenir le contrôle de l'asthme du malade. **UNICAST®** peut traiter l'asthme seulement avec l'usage continué.
- Pour l'asthme d'exercice-induit, le malade devrait prendre **UNICAST®** au moins 2 heures avant l'exercice, mais pas plus qu'une fois quotidiennement.
- **Les Mesures ont utilisé qu'aide réduisant la sévérité de symptômes d'asthme et la fréquence d'assauts d'asthme:**
 - o Éviter ou réduire le contact avec les conditions qui peuvent déclencher un épisode d'asthme (par exemple fumier passif, loger des acariens de poussière, les blattes, les moutles, le pollen, les pellicules animales, les changements dans le temps et la température et les infections dans l'aéroroute supérieure comme les froids).
 - o Développer un projet de traitement qui le meilleurs asthme de contrôlés, qui inclut l'usage correct de tous médicaments prescrits pour l'asthme.

Contre-indications:

L'hypersensibilité à Montelukast ou n'importe quel de l'excipients disponible dans le produit.

Précautions:

- **UNICAST®** 4 mg les comprimés mastiquables sont pour les enfants a vieilli 2 à 5 ans mais pas recommandé pour l'usage dans les enfants moins que deux ans mais puisque la sécurité et l'efficacité de Montelukast dans les enfants plus jeunes que 2 ans vieux n'ont pas été pourtant établis.
- **UNICAST®** 5 mg les comprimés mastiquables sont pour les enfants a vieilli 6 à 14 ans pendant qu'**UNICAST®** 10 comprimés de mg ne sont pas recommandées pour l'usage dans les enfants sous 15 ans majeurs.
- **UNICAST®** 4 mg & 5 mg les comprimés mastiquables contiennent Aspartame, une source de phénylalanine. Le phénylalanine dans les comprimés peut être nuisible aux malades avec phenylketonuria.
- **UNICAST®** 10 comprimés de mg contiennent du Lactose. Les malades avec les problèmes héréditaires rares d'intolérance de galactose, le manque de lactase lapon ou malabsorption de glucose-galactose ne devrait pas prendre Montelukast.
- **Montelukast** n'est pas voulu pour le traitement d'assaut soudain d'essoufflement et ne devrait jamais être utilisé à cet effet. Si un assaut arrive, les instructions que le médecin a donnée devraient être exactement suivies. C'est très important d'avoir les médicaments nécessaires pour le tout un assaut (i.e.-d. un agit court bêta-agoniste inhalé) facilement accessible à tout instant.
- C'est important d'avoir tous les médicaments d'asthme prescrits par le médecin comme voulu. Montelukast ne devrait pas remplacer les médicaments d'asthme (soit inhalé ou pris par la bouche) que le malade peut utiliser déjà.



يونيكاست®

مونتلوكاست الصوديوم

الوصف:

يونيكاست® (مونتلوكاست الصوديوم) هو مضاد انتقائي لمستقبلات ليكوتريين فعال فورياً ويؤتبط بحداجد عالي وانتقائي لمستقبلات سيستيل ليكوتريين CysLT1. يعمل على إعاقة عمل ليكوتريين والذي يعتبر مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في الشترن، والتي تسبب تضيقاً في المجاري الهوائية والتهاب في الرئتين مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو. كما ويسهم ليكوتريين أيضاً في أعراض الحساسية، لذا فإن إعاقة عمل ليكوتريين يحسن من أعراض الحساسية الموسمية.

الخصائص:

يونيكاست® بشكل سريع بعد تناول الجرعة عن طريق الفم، أكثر من ٩٩ ٪ منه يرتبط بروتينات الحصل. يمتلك مونتلوكاست توزيع ضئيل خلال الحاجز الدموي الدماغي، يبلغ متوسط حجم التوزيع في مرحلة الثبات لمونتلوكاست من ٨ إلى ١١ لتر.

يستقلب مونتلوكاست بشكل كفيف ولكن لا يتم الكشف عن تركيزات المستقلبات في البلازما في مرحلة الثبات بعد المرضي البالغين والأطفال.

يبلغ متوسط نصفية مونتلوكاست من البلازما ٤ ± مل، إبقاء بعد البلوغ في البالغين الأصحاء. عموماً، ما يطرَح مونتلوكاست ومستقلباته بشكل كبير من خلال الصفراء.

يُطوَر عمر مونتلوكاست النصفِي في البلازما قليلاً في البالغين. لا يوجد حاجة لتعديل الجرعة في المرضى كبار السن، المرضى الذين يعانون من قصور في الكبد خفيف إلى متوسط الحدة و المرضي الذين يعانون من قصور في الكلى.

دواعي الاستعمال:

يوصف يونيكاست® بـ:

- الربو: يستعمل يونيكاست® في العلاج طويل الأمد للمرضى المستعدين بالرَبو، البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٢ شهراً فما فوق والذين لا يستفيدون كما ينبغي من أدويةهم على الربو ويحتاجون إلى علاج إضافي. يجب عدم استعمال مونتلوكاست للملاج الحاد الحوري، ولصدّة التي يتبعدها نوبات ربو.
- منع ظهور أعراض الربو نتيجة عن ممارسة التمارين الرياضية: يستعمل يونيكاست® لمنع ظهور أعراض الربو نتيجة عن ممارسة التمارين الرياضية في المرضى الذين تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فما فوق.

- التهابات الأنف التحسسية: يستعمل يونيكاست® للمساعدة في السيطرة على أعراض التهاب الأنف التحسسي (عطاس، انسداد في الأنف، سيلان في الأنف، حكة في الأنف).

يستعمل يونيكاست® في علاج التهاب الأنف التحسسي الموسمي في البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستين فما فوق، وعلاج التهاب الأنف الدائم في البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٦ سنوات فما فوق.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

- الأطفال من ٦ إلى ١١ سنة: تؤخذ الجرعة الإعتيادية في فِرس واحد يومياً من أقرص يونيكاست® ٤. ملغم الفقالة المضغ.

- الأطفال من ١٢ إلى ١٦ سنة: تؤخذ الجرعة الإعتيادية في فِرس واحد يومياً من أقرص يونيكاست® ٥. ملغم الفقالة المضغ.

- البالغين والمرافقين من عمر ١٥ سنة فما فوق: تؤخذ الجرعة الإعتيادية في فِرس واحد يومياً من أقرص يونيكاست® ١٠ ملغم.

ملاحظات المرضي:

- ينبغي يونيكاست® في المساء، بعد وقت النوم، بعض النظر عن تناول الطعام، ويجب أن تمضغ (أقرص يونيكاست® ٤) أو تناول (أقرص يونيكاست® ١٠ ملغم) يومياً وفي نفس الوقت تقريباً.
- يجب عدم استعمال يونيكاست® المتزامن مع مستحضرات أخرى تحتوي على نفس المكون الفعّال.
- من الضروري استشارة الطبيب في تناول يونيكاست® بعض المرضي في وجود الأقرص، ولصدّة التي يتبعدها نوبات الربو التي تسبب المرضي.

- مع تناول يونيكاست® الربو عند استعماله بشكل مستمر، تظهر في حالة ظهور أعراض الربو نتيجة عن ممارسة التمارين الرياضية، فإِذا يجب على المرضي تناول يونيكاست® قبل التمارين الرياضية بما يتناسب في الأنف، ولكن ليس لأكثر من مرة واحدة يومياً.
- **الجرعات المستعملة للمساعدة في خفض حدة أعراض الربو وصدية نكوت حاد:**
 - o يجب إيجاد طرق لتفادي أو تقليل الاحتكاك بالعوامل التي قد تثير أعراض الربو (مثل، التدخين والذي يتضمن التدخين السليبي، عدم التمرز، الصراصير، الغفن، غبار الطلع، حرائق شعير أو ريش الحيوانات، تغطيات القطن والحارّة والانتفاخ التي تسبب المجاري الهوائية العليا مثل الرشح).
 - o تجنب أو تقليل التماس مع الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث نوبات الربو.
- يجب برنامج معالجة أفضل طرق السيطرة على الربو، والذي يتضمن استعمال جميع الأدوية الموصوفة لعلاج الربو بشكل صحيح.

مواعيد الاستعمال:

أقرص مونتلوكاست® أو لأي من المكونات المتوفرة في هذا المستحضر.

احتياطات الاستعمال:

- إن أقرص يونيكاست® ٤ ملغم الفقالة المضغ مخصصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم من ٢ إلى ٥ سنوات ولكنها غير موصى باستعمالها في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستين؛ لا يتم إثبات بعد مدى أمن وفعالية مونتلوكاست في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستين.
- إن أقرص يونيكاست® ٥ ملغم الفقالة المضغ مخصصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم من ٦ إلى ١٦ سنة بينما أقرص يونيكاست® ١٠ ملغم غير موصى باستعمالها في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة.
- تحتوي أقرص يونيكاست® ٤ و ٥ ملغم الفقالة المضغ على أسبارتام، والذي يعتبر مصدر لفيثيل الألفين. إن أفيثيل الألفين الموجود في هذه الأقرص قد يسبب الأذى للمرضى الذين يعانون من داء ثنائي فليفيل كيتوزية.
- تحتوي أقرص يونيكاست® ٥ ملغم على لأكثوز. يجب عدم تناول مونتلوكاست في المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة مثل عدم تحمل اللاكتوز، أو اختلال إنزيم لآب لأكثاز أو سوء هاضم الأمعاء، أو الحساسية لللاكتوز.
- مونتلوكاست® ١٠ ملغم الفقالة المضغ مخصصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٦ إلى ١٦ سنة بينما أقرص يونيكاست® ٤ و ٥ ملغم غير موصى باستعمالها في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة.
- لا يستعمل مونتلوكاست في علاج نوبة حثيق الفقرة العنق ويجب عدم استعماله أبداً أثناء الغرض. عند حدوث نوبة، فإِذا يجب اتباع تعليمات الطبيب الموصوفة بشكل دقيق. من المهم جداً أن تكون الأدوية الضرورية لثقل داء العنق في متناول اليد دائماً (على سبيل المثال مضاميكات مستقلبات ثنائي قصيرة الأمد (الاستشفائية) في كل الأوقات.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

الشركة المتحدة لصناعة الأدوية ذ.م.م
ص.ب ٦٩ عمان ١١٥٩١ الأردن